



Pielęgnacja suchej skóry

FIZYCZNA OCHRONA SKÓRY NA ZEWNĄTRZ

LANOLINA³

Integruje się z górną warstwą naskórka:

- wzmacnia ją tworząc barierę mechaniczną
- chroni przed podrażnieniami
- chroni przed wysuszeniem zmniejszając przynaskórkową utratę wody

METABOLICZNA OCHRONA SKÓRY OD WEWNĄTRZ

PANTENOL

Prowitamina B5 wnika w głąb skóry:

- wspomaga procesy regeneracyjne i odbudowę bariery naskórka
- poprawia uwodnienie warstwy rogowej naskórka

Sprawdzona ochrona dla całej rodziny dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień



CH-20230614-79

3. Atherton D.J., A review of the pathophysiology, prevention and treatment of irritant diaper dermatitis, Department of Paediatric Dermatology, Great Ormond Street Hospital for Children, London WC1N 3JH, UK, 2004.

Bepanthen® Baby



Sprawdzona ochrona dla całej rodziny






Ochrona przed odparzeniami pieluszkowymi

Włączenie maści **Bepanthen® Baby** do codziennej pielęgnacji zmniejsza **3-krotnie ryzyko wystąpienia odparzeń pieluszkowych**¹

Częstość występowania odparzeń u 12 par bliźniąt (%)



W REKOMENDACJI
Nr 1
POŁOŻNYCH



produkt od 1. dnia życia



odpowiedni dla wcześniaków



prosty skład



bez barwników, bez konserwantów



lekka konsystencja, która pozwala skórze oddychać



zawiera lanolinę i pantenol

Bepanthen® Baby chroni przed odparzeniami wykazując potrójne działanie

MAŚĆ BEPANTHEN® BABY Formuła potrójnego działania



Nawilżenie

Dzięki zawartości witaminy B5 utrzymuje skórę miękką, gładką i nawilżoną



Ochrona

Tworzy przezroczystą warstwę ochronną, która pozwala skórze oddychać




Regeneracja

Dzięki wysokiemu stężeniu witaminy B5 wspomaga naturalne procesy regeneracyjne



Wsparcie brodawek sutkowych w czasie karmienia piersią

Jednymi z najczęściej występujących trudności laktacyjnych po porodzie są bolesność i uszkodzenie brodawek sutkowych²



Badanie ankietowe przeprowadzone z udziałem 186 matek karmiących w Klinice Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobietych Akademii Medycznej w Gdańsku.

Jak można poprawić komfort karmienia piersią:



Pomoc położnej podczas przystawiania dziecka do piersi



Przyzwyczajanie dziecka do głębokiego chwytania brodawki sutkowej



Zaniechanie podawania smoczka



Smarowanie brodawek własnym pokarmem



Stosowanie maści ochronnej na brodawki



Jeżeli pozostałości maści widoczne są na brodawkach przed kolejnym karmieniem zaleca się ich usunięcie

1. Putet et al.: Bepanthen ointment in the prevention and treatment of diaper rash on premature and full-term babies; Real Pediatr. 2001;63:33-8.
Częstość występowania odparzeń w badaniu Bepanthen (4x/dzień) = 17% vs 58% w grupie kontrolnej. Bepanthen Ointment cosmetics status UI:1600198
* Business Point, badanie opinii położnych kategoria maści do pielęgnacji okolic okołopieluszkowych, przeprowadzone metodą CAWI na próbie n=202 położnych, styczeń 2023

2. Kielbratowska B i wsp.: Bolesność brodawek - najczęściej występujący problem laktacyjny wśród położnic przebywających w oddziale położniczym; Ann UMCS. 2005; Vol. 60, Suppl. 16, 201: 394-397.